

Grelha de referência (artigo 5.º do DL n.º 79/2026)

Grupo de patologias	Tipo de patologia e situação de referência (subtipo histológico de referência ao diagnóstico e estadio inicial)	Condições para aplicação	Prazo
Sistema nervoso central	Astrocitoma pilocítico, grau I	Idade ao diagnóstico: ≥ 21 anos e ≤ 60 anos	5 anos desde a primeira intervenção terapêutica antineoplásica
Sistema nervoso central	Meningiomas cerebrais de grau I	Ressecção cirúrgica completa; sem recorrência imagiológica; sem radioterapia; sem défice cognitivo ou neurológico	2 anos após o final do último protocolo terapêutico e sem recidiva
Sistema nervoso central	Meningiomas cerebrais não progressivos	Estabilidade imagiológica durante 5 anos; ausência de défice cognitivo ou neurológico	5 anos após o final do último protocolo terapêutico e sem recidiva
Tiroide	Carcinoma papilar ou folicular, estadio I	Idade ao diagnóstico: < 45 anos	2 anos após o final do último protocolo terapêutico e sem recidiva
Tiroide	Carcinoma papilar, estadio I ou II	Idade ao diagnóstico: ≥ 45 anos	5 anos após o final do último protocolo terapêutico e sem recidiva
Mama	Carcinoma lobular ou ductal estrito in situ (sem microinvasão)	Tratamento segundo consenso europeu (ESMO / St. Gallen)	2 anos após o final do último protocolo terapêutico e sem recidiva
Mama	Carcinoma ductal in situ com microinvasão ≤ 1 mm e sem metástases ganglionares	Tratamento segundo consenso europeu (ESMO / St. Gallen)	5 anos após o final do último protocolo terapêutico e sem recidiva
Pele	Melanoma in situ, sem microinvasão ou nível I de Clark	Excisão completa; ausência de síndrome do nevo displásico	2 anos após o final do último protocolo terapêutico e sem recidiva
Útero	Neoplasias intraepiteliais cervicais ou carcinoma in situ sem microinvasão	Tratamento segundo protocolo nacional ou orientações europeias aplicáveis	2 anos após o final do último protocolo terapêutico e sem recidiva
Testículo	Seminoma puro, estadio I	—	2 anos após o final do último protocolo terapêutico e sem recidiva
Testículo	Seminoma puro, estadio II	—	5 anos após o final do último protocolo

			terapêutico e sem recidiva
Testículo	Tumores não seminomatosos ou mistos, estadios I ou II	—	5 anos após o final do último protocolo terapêutico e sem recidiva
Próstata	Adenocarcinoma T1N0M0 ou T2aN0M0, PSA <10 ng/ml, Gleason ≤6	PSA pós-tratamento dentro dos limites legais	2 anos após o final do último protocolo terapêutico e sem recidiva
Próstata	Adenocarcinoma em vigilância ativa (≤T1c, PSA ≤10, Gleason ≤6)	Idade >55 anos; sem tratamento	2 anos após o final do último protocolo terapêutico e sem recidiva
Rim	Carcinoma de células claras T1N0M0	Idade >50 anos	5 anos após o final do último protocolo terapêutico e sem recidiva
Rim	Carcinoma de células cromofóbicas T1N0M0	—	5 anos após o final do último protocolo terapêutico e sem recidiva
Cólon e reto	Adenocarcinoma estadio 0 (pTis)	Idade >50 anos	2 anos após o final do último protocolo terapêutico e sem recidiva
Cólon e reto	Adenocarcinoma estadio I (pT1N0M0)	Idade >50 anos	5 anos após o final do último protocolo terapêutico e sem recidiva
Sistema hematopoiético	Leucemia promielocítica aguda (LAM3)	Sem intercorrências major	5 anos após o final do último protocolo terapêutico e sem recidiva
Sistema hematopoiético	Leucemia mieloide crônica	bcr-abl indetetável durante 36 meses	5 anos desde diagnóstico
Sistema hematopoiético	Leucemia/Linfoma de Burkitt ou LLA-L3	≤60 anos; tratamento completo; ECOG 0–1	5 anos desde diagnóstico
Sistema hematopoiético	Linfoma de Hodgkin estadio 1A	—	2 anos após o final do último protocolo terapêutico e sem recidiva
Sistema hematopoiético	Linfoma de Hodgkin estadio 1B ou 2A	—	5 anos após o final do último protocolo terapêutico e sem recidiva